

< 抗血栓薬内服中の大腸内視鏡検査に関する新規定 >
抗血栓薬 一覧表

<u>休薬不要でホリブ切除可</u>		<u>主治医許可の上、 休薬しホリブ切除可</u>	<u>ホリブ切除不可</u>
<u>アスピリン系</u> キャブピリン タケルダ バイアスピリン バファリン	<u>その他の抗血小板剤</u> アンフラグ (塩酸サロゲレート) エパテール(イコサペント酸エチル) カナクリン(カリジソナーゼ) コリアン(塩酸ジラセブ) ドルナー(ベラプロストナトリウム) プレタール(シロスタゾール) ヘルサンチン(ジピリダモール) オールモン(リマプロストアルファテクス) ロコナル(トレピジル) ロトリカ (オメガ-3脂肪酸エチル)	<u>チエノピリジン系</u> <u>(5日前から休薬)</u> エフィント(プラスゲル) パナルジン(チクロピジン) プラビックス(硫酸クロピドゲル) プリント(チカゲレロル)	<u>ワーファリン</u> ワルファリンカ リウム <u>コンプラビン</u> (ロレアス) * 2剤併用 * 薬が不明な場合
		<u>DOAC</u> <u>(検査当日のみ休薬)</u> イグザレルト(リバロキサパン) エリキューズ プラザキサ リクシアナ	

* 代表商品名 (成分名/後発品名) 後発品については要確認

早期胃癌検診協会附属茅場町クリニック作成 (2026.4)

- ✓ ご自身が飲んでいるお薬がどれに該当するかは、上記の一覧表をご参照下さい。
- ✓ 自己判断での休薬は、塞栓症をおこす危険がありますので、絶対にしないでください。
- ✓ 休薬の判断は、お薬を処方している先生にご相談の上、指示を仰いでください。
 当院を受診する前に主治医の先生に休薬について相談された場合は、
 その内容を紹介状に書いて頂くようお願いします。
- ✓ 受診時・検査時には「お薬手帳」のご持参をお願いします。ご自身が飲んでいる薬がわからない場合は、生検/ホリブ切除なし、観察のみとなりますのでご注意ください。